Herkenningskaart uitheemse steuren

In ons land worden diverse uitheemse steursoorten in het wild aangetroffen: diamantsteur (*Acipenser gueldenstaedtii*) (synoniemen: Russische steur en Donausteur), Siberische steur (*A. baerii*), spitssnuitsteur (*A. stellatus*) en sterlet (*A. ruthenus*). De Europese steur (*A.* sturio) is uitgestorven in het Rijnstroomgebied, maar de afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven (zoals uitzettingen) opgestart om de inheemse steur weer terug in de Rijn te krijgen.

Kenmerken om op te letten



Beenplaten Europese steur

Met een combinatie van een paar uiterlijke kenmerken kan de juiste soort op naam gebracht worden:

- Aantal, contrast en formaat beenplaten op de flank (**A**)
- Snuitvorm
- Positie en structuur bekdraden

Let op: snuitvorm, kleur en contrast tussen beenplaten en lichaamsbouw veranderen sterk naarmate steuren ouder worden. Jonge steuren hebben een spitsere snuit en zijn contrastrijker.

Sterlet (*Acipenser ruthenus*)

Lengte afgebeeld dier: 25 cm

Beenplaten: Contrastrijk | Klein | Aantal = 56-70



Max. lengte 100 cm | **Gem. lengte** 30-60 cm

Snuit: Spits



[1] *Andere steursoorten op deze kaart hebben gladde bekdraden*

Siberische steur (*Acipenser baerii*)

Lengte afgebeeld dier: 55 cm

Beenplaten: Contrastarm | Zeer klein | Aantal = 32-62



Max. lengte 200 cm | **Gem. lengte** 80-140 cm

Snuit: Spits



Spitssnuitsteur (*Acipenser stellatus*)

Lengte afgebeeld dier: 25 cm

Beenplaten: Contrastrijk | Groot | Aantal = 26-43



Max. lengte 220 cm | **Gem. lengte** 128-150 cm

Snuit: Lang en spits



Diamantsteur (*Acipenser gueldenstaedtii*)

Lengte afgebeeld dier: 95 cm

Beenplaten: Contrastrijk | Groot | Aantal = 24-50



Max. lengte 200 cm | **Gem. lengte** 100-150 cm

Snuit: Kort en stomp



Herkenningskaart uitheemse steuren - vervolg

Europese steur (*Acipenser sturio*) - uitgestorven

Lengte afgebeeld dier: 60 cm

Beenplaten: Contrastrijk | Groot | Aantal = 24-40

Snuit: Spits

Rugvin: hoger dan breed[2]





Max. lengte 350 cm | **Gem. lengte** 130-220 cm

[2] *Hoogte rugvin van andere steursoorten op deze kaart zijn kleiner of gelijk aan de breedte.*

Kweekvormen en hybriden

Kweekvormen en hybriden komen helaas ook in het wild voor. Veel steursoorten kunnen hybridiseren en hebben mogelijk verwarrende uiterlijke kenmerken. Bij twijfel, maak goede foto's + beschrijvingen en geef je waarneming door!



Albino Siberische steur

Zebra steur *(kweekvariant van de diamantsteur)*

Verspreiding en voorkomen

Uitheemse steuren worden tegenwoordig steeds vaker aangetroffen. Veel waarnemingen (excl. visvijvers) komen uit grote wateren zoals rivieren, kanalen en recreatieplassen in en rondom stedelijk gebied.





Waarnemingen

Geef viswaarnemingen door via **Waarneming.nl**, **Telmee.nl**, **Mijnvismaat.nl** of **Vangstenregistratie.nl.** Deze gegevens zijn van groot belang voor inzicht in de verspreiding en trends van verschillende vissoorten.

Samenstelling: Mark Groen
Vormgeving: Kris Joosten
Foto's: Jelger Herder
Tekeningen: Paul Veenvliet

RAVON
www.ravon.nl